

Prot-N - 4360/V.7
del 28-10-2021



ASL Foggia

PugliaSalute

Dipartimento di Prevenzione
ASL FOGGIA
Viale Di Vittorio 21, Cerignola

Ai Dirigenti Scolastici

Cerignola, 26/10/2021

Oggetto: implementazione vaccinazione anti HPV – **"I MARTEDI' DELLA PREVENZIONE"**

Carissimi tutti, mai come in questo periodo delicato si è compreso il ruolo fondamentale della prevenzione ed è proprio questo il motivo di tale missiva attraverso la quale torno a chiedere la Vostra preziosa collaborazione.

In allegato a questa mail troverete una locandina e una lettera informativa che spero riusciate a diffondere ai genitori dei vostri alunni avvalendovi del prezioso mezzo del REGISTRO ELETTRONICO; tale materiale ha lo scopo di sensibilizzare genitori e alunni in merito alla vaccinazione anti-HPV, nell'ambito della prevenzione primaria del carcinoma della cervice uterina e di altre patologie causate dal medesimo virus.

Il nostro ambulatorio ha istituito **" I MARTEDI' DELLA PREVENZIONE"** con accesso diretto pomeridiano e senza alcuna prenotazione col fine di effettuare tale vaccinazione su più larga scala.

Sicura di una vostra collaborazione cogliamo l'occasione per ringraziarVi ancora una volta e salutarVi affettuosamente.

DOTT.SSA BALENA E IL SUO STAFF



Ai Genitori degli alunni

Oggetto: invito alla vaccinazione contro il Virus del Papilloma Umano (HPV)

La Regione Puglia, nell'ambito di un Progetto Nazionale, ha avviato già dal 2008 la campagna di vaccinazione contro il Virus del Papilloma Umano (detto anche Human Papilloma Virus o HPV). L'infezione da HPV è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) essere la causa del Carcinoma della cervice (o collo) dell'utero, un tumore dell'apparato genitale femminile; inoltre in entrambi i sessi è causa di carcinomi dell'apparato anogenitale, della lingua e della gola, nonché di lesioni cutanee molto diffuse e contagiose come i condilomi acuminati (verruche anogenitali). La vaccinazione, raccomandata e offerta attivamente in tutta Italia agli adolescenti a partire dagli 11 anni di età, fornisce l'opportunità di proteggere Vostro/a figlio/a dal rischio delle malattie.

QUALORA NON AVESSE GIA' PROVVEDUTO AUTONOMAMENTE, è invitato/a assieme a suo figlio/a per l'esecuzione della vaccinazione HPV:

TUTTI I MARTEDI'
DALLE 15.30 ALLE 17

presso

AMBULATORIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – V.LE G. DI VITTORIO 21- CERIGNOLA - P. TERRA

***NOTA BENE:* IL PRESENTE INVITO VALE COME PRENOTAZIONE ED E' ESTESO ANCHE PER I
RESIDENTI DEI 5 REALI SITI (CARAPELLE, ORDONA, ORTA NOVA, STORNARA STORNARELLA)
CHE POTRANNO AFFERIRE PRESSO L'AMBULATORIO DI CERIGNOLA.**

L'infezione da HPV, a trasmissione sessuale o anche per semplice contatto, è molto frequente e diffusa. La maggior parte delle donne la contrae almeno una volta nella vita e in genere non causa alterazioni, risolvendosi da sola; in una minoranza dei casi la persistenza dell'infezione può provocare delle alterazioni alle cellule del collo uterino. La maggior parte di queste alterazioni guarisce spontaneamente ma alcune possono evolvere molto lentamente verso forme precancerose e poi tumorali, diagnosticabili precocemente con il PAP-TEST, un test di prevenzione basato sulla ricerca tramite striscio vaginale di eventuali cellule alterate dell'utero che si raccomanda a tutte le donne dai 25 ai 64 anni. I nuovi casi di carcinoma della cervice uterina sono in Italia ogni anno all'incirca 3500; circa 1000 donne annualmente in Italia muoiono per tale causa. Ad oggi sono stati classificati oltre cento tipi di HPV e tra questi 40 sono associati a patologie del tratto ano-genitale, sia benigne (condilomi) che maligne (cancro della cervice dell'utero). Per tale motivo diversi tipi di HPV vengono identificati in genotipi ad alto e basso rischio di trasformazione cancerosa; tra i primi, i genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, e 58 16 (contro i quali è specificamente rivolto il vaccino) sono responsabili di circa il 70% di tutti i carcinomi della cervice uterina e di quasi il 40% delle lesioni a basso rischio. In entrambi i sessi, i ceppi 6 e 11 sono causa di carcinomi dell'apparato ano-genitale, della lingua e della gola, nonché di lesioni cutanee molto diffuse e contagiose come i condilomi acuminati (verruche anogenitali).

Per nostra fortuna abbiamo a disposizione un'arma valida, UTILIZZIAMOLA!!!

La vaccinazione prima dell'esordio sessuale risulta, infatti, particolarmente vantaggiosa, perché induce la produzione di una risposta immunitaria prima di un eventuale contagio con HPV, determinando quindi le migliori condizioni per la relativa protezione. In questo contesto si inserisce il programma di prevenzione primaria dell'infezione HPV tramite la vaccinazione, che viene raccomandata e offerta attivamente in tutta Italia agli adolescenti a partire dagli 11 anni di età, fornendovi l'opportunità di proteggere Vostro/a Figlio/a dal rischio delle malattie dei genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, e 58 dei Virus HPV. Il vaccino non contiene virus intero né vivente, ma solo una sua parte proteica ottenuta artificialmente con raffinate tecniche di laboratorio; viene inoculato in 2 dosi nel muscolo deltoide del braccio. Il calendario di somministrazione prevede la seconda dose a sei mesi dalla prima. Non necessita di alcuna prescrizione da parte del Medico curante e non occorre essere a digiuno prima della vaccinazione.

Per ogni ulteriore informazione Vi preghiamo di inviare una mail all'indirizzo:

ambulatoriocerignola@gmail.com

Cordiali saluti.

Il Dir. Medico

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Cerignola

Dr.ssa Viviana Balena

INFORMATIVA PER LA VACCINAZIONE CONTRO IL VIRUS DEL PAPILLOMA UMANO (HPV)

Lo scopo della vaccinazione è quella di indurre la produzione di anticorpi e creare una difesa immunitaria nei confronti del virus prima che esso penetri nelle cellule mucosali; per questo motivo la vaccinazione risulta molto efficace prima dell'esordio sessuale.

Il vaccino non contiene virus intero né vivente, ma è costituito di una componente proteica costruita artificialmente mediante raffinate tecniche di laboratorio; il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di 2 dosi inoculate nel muscolo deltoide del braccio.

Si ricorda che in caso di malattia febbrile acuta è necessario posticipare la somministrazione del vaccino, mentre la presenza di un'infezione lieve, come un raffreddore, non costituisce controindicazione all'immunizzazione.


La vaccinazione potrebbe provocare in alcuni casi sintomi come dolore e irritazione (gonfiore, arrossamento) nella sede di inoculazione, accompagnati o meno da febbre e affaticamento, oppure mal di testa o dolori muscolari. La maggioranza di tali reazioni è di gravità lieve e non di lunga durata; da qui l'importanza di segnalare al proprio Medico la comparsa di eventuali sintomi particolari.

Ulteriori informative potranno essere fornite verbalmente in sede ambulatoriale.

www.salute.gov

www.vaccinarsi.org






L'AMBULATORIO VACCINALE DI CERIGNOLA VI ASPETTA PER:

«I MARTEDI' DELLA PREVENZIONE»

**OGNI MARTEDI' DALLE 15.30 ALLE 17 POTRETE ACCEDERE
PRESSO IL NOSTRO AMBULATORIO PER EFFETTUARE LA
VACCINAZIONE ANTI HPV SENZA PRENOTAZIONE A PARTIRE
DAGLI 11 ANNI DI ETA'**



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene e sanità Pubblica
Sede di Cerignola - Via Giuseppe Di Vittorio, 21